



Teste Intermédio

## **Matemática A**

### **Versão 2**

Duração do Teste: 90 minutos | 24.05.2012

### **12.º Ano de Escolaridade**

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

**Na sua folha de respostas, indique de forma legível a versão do teste.**

# Formulário

---

## Geometria

### Comprimento de um arco de circunferência:

$\alpha r$  ( $\alpha$  – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro;  $r$  – raio)

### Áreas de figuras planas

**Losango:**  $\frac{\text{Diagonal maior} \times \text{Diagonal menor}}{2}$

**Trapézio:**  $\frac{\text{Base maior} + \text{Base menor}}{2} \times \text{Altura}$

**Polígono regular:**  $\text{Semiperímetro} \times \text{Apótema}$

### Sector circular:

$\frac{\alpha r^2}{2}$  ( $\alpha$  – amplitude, em radianos, do ângulo ao centro;  $r$  – raio)

### Áreas de superfícies

**Área lateral de um cone:**  $\pi r g$  ( $r$  – raio da base;  $g$  – geratriz)

**Área de uma superfície esférica:**  $4\pi r^2$  ( $r$  – raio)

## Volumes

**Pirâmide:**  $\frac{1}{3} \times \text{Área da base} \times \text{Altura}$

**Cone:**  $\frac{1}{3} \times \text{Área da base} \times \text{Altura}$

**Esfera:**  $\frac{4}{3}\pi r^3$  ( $r$  – raio)

## Trigonometria

$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$

$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

$\text{tg}(a + b) = \frac{\text{tga} + \text{tgb}}{1 - \text{tga} \text{tgb}}$

## Complexos

$(\rho \text{ cis } \theta)^n = \rho^n \text{ cis } (n\theta)$

$\sqrt[n]{\rho \text{ cis } \theta} = \sqrt[n]{\rho} \text{ cis} \left( \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right)$  ( $k \in \{0, \dots, n-1\}$  e  $n \in \mathbb{N}$ )

## Probabilidades

$\mu = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n$

$\sigma = \sqrt{p_1 (x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n (x_n - \mu)^2}$

Se  $X$  é  $N(\mu, \sigma)$ , então:

$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0,6827$

$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0,9545$

$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0,9973$

## Regras de derivação

$(u + v)' = u' + v'$

$(u v)' = u' v + u v'$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' v - u v'}{v^2}$

$(u^n)' = n u^{n-1} u'$  ( $n \in \mathbb{R}$ )

$(\sin u)' = u' \cos u$

$(\cos u)' = -u' \sin u$

$(\text{tg } u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$

$(e^u)' = u' e^u$

$(a^u)' = u' a^u \ln a$  ( $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ )

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$  ( $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ )

## Limites notáveis

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$  ( $n \in \mathbb{N}$ )

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + 1)}{x} = 1$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty$  ( $p \in \mathbb{R}$ )

## GRUPO I

- Os cinco itens deste grupo são de escolha múltipla. Em cada um deles, são indicadas quatro opções, das quais só uma está correta.
- Escreva na sua folha de respostas apenas o número de cada item e a letra correspondente à opção que selecionar para responder a esse item.
- Não apresente cálculos, nem justificações.
- Se apresentar mais do que uma opção, a resposta será classificada com zero pontos, o mesmo acontecendo se a letra transcrita for ilegível.

1. Seja  $b$  um número real maior do que 1 e seja  $a = b^\pi$

Qual é o valor, arredondado às unidades, de  $\log_b(a^{100} \times b^{14})$  ?

- (A) 4398                      (B) 1444                      (C) 328                      (D) 144


2. Seja  $g$  uma função de domínio  $\mathbb{R}^+$ , contínua em todo o seu domínio.

Sabe-se que:


- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$
- a bissetriz dos quadrantes ímpares é assíntota do gráfico de  $g$

Em qual das opções seguintes pode estar representado o gráfico da função  $\frac{1}{g}$  ?


(A)




(B)



(C)



(D)



3. Relativamente a duas funções,  $f$  e  $g$ , sabe-se que:

- têm domínio  $[1, 3]$
- são funções contínuas
- $f(1) - g(1) < 0$  e  $f(3) - g(3) > 0$

Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira?

- (A) A função  $f - g$  é decrescente.
- (B) A função  $f - g$  é crescente.
- (C) Os gráficos de  $f$  e  $g$  não se intersectam.
- (D) Os gráficos de  $f$  e  $g$  intersectam-se em pelo menos um ponto.

4. Uma escola secundária tem alunos de ambos os sexos em todos os anos de escolaridade.

Escolhe-se, ao acaso, um aluno dessa escola.

Sejam  $A$  e  $B$  os acontecimentos:

$A$ : «O aluno é do sexo masculino»

$B$ : «O aluno está no 10.º ano»

Qual das expressões seguintes designa o acontecimento «o aluno é do sexo feminino e não está no 10.º ano»?

- (A)  $A \cup B$
- (B)  $\overline{A \cup B}$
- (C)  $A \cap B$
- (D)  $\overline{A \cap B}$

5. Na Figura 1, está representado, no plano complexo, o triângulo equilátero  $[OPQ]$  de altura  $\sqrt{3}$

Tal como a figura sugere, o vértice  $O$  coincide com a origem do referencial, o vértice  $P$  pertence ao eixo imaginário e o vértice  $Q$  pertence ao 2.º quadrante.

Seja  $z$  o número complexo cuja imagem geométrica é o ponto  $Q$

Qual é a representação trigonométrica do número complexo  $z$  ?

- (A)  $2 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$
- (B)  $2 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$
- (C)  $3 \operatorname{cis} \frac{5\pi}{6}$
- (D)  $3 \operatorname{cis} \frac{2\pi}{3}$




Figura 1

## GRUPO II

---

Nas respostas aos itens deste grupo, apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e todas as justificações necessárias.

**Atenção:** quando, para um resultado, não é pedida a aproximação, apresente sempre o valor exato.

---

1. Seja  $\mathbb{C}$  o conjunto dos números complexos;  $i$  designa a unidade imaginária.

Para um certo número inteiro  $x$ , a expressão  $\frac{(\sqrt{2}i)^3 \times \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}}{x+i}$  designa um número real.

Determine esse número  $x$

2. Uma caixa, que designaremos por caixa 1, tem uma bola preta e três bolas brancas.

2.1. Considere a experiência que consiste em tirar, ao acaso, uma bola da caixa 1, observar a sua cor e voltar a colocar a bola na caixa. Efetua-se esta experiência cinco vezes.

Qual é a probabilidade de sair bola preta pelo menos quatro vezes?

2.2. Outra caixa, que designaremos por caixa 2, tem duas bolas brancas e três bolas pretas.

Realiza-se a seguinte experiência: ao acaso, tiram-se duas bolas da caixa 1 e colocam-se na caixa 2; em seguida, tiram-se simultaneamente duas bolas da caixa 2.

Sejam  $A$  e  $B$  os acontecimentos:

$A$ : «As bolas retiradas da caixa 1 são da mesma cor»

$B$ : «As bolas retiradas da caixa 2 são da mesma cor»

Determine o valor de  $P(\overline{B} | A)$ , sem utilizar a fórmula da probabilidade condicionada.

Numa pequena composição, justifique a sua resposta.

A sua composição deve contemplar:

- o significado de  $P(\overline{B} | A)$ , no contexto da situação descrita;
- a explicação do conteúdo da caixa 2 após a realização do acontecimento  $A$
- a explicação do número de casos possíveis;
- a explicação do número de casos favoráveis;
- a apresentação do valor da probabilidade pedida.

3. Relativamente à Figura 2, sabe-se que:

- o segmento de reta  $[PR]$  tem comprimento 4
- o ponto  $Q$  é o ponto médio de  $[PR]$
- o segmento de reta  $[QS]$  é perpendicular a  $[PR]$
- o arco de circunferência  $RS$  tem centro em  $Q$




Figura 2

Admita que um ponto  $A$  se desloca ao longo do arco  $RS$ , nunca coincidindo com  $R$  nem com  $S$ , e que um ponto  $B$  se desloca ao longo do segmento de reta  $[QR]$  de tal forma que  $[AB]$  é sempre perpendicular a  $[QR]$

Para cada posição do ponto  $A$ , seja  $x$  a amplitude, em radianos, do ângulo  $RQA$  e seja  $S(x)$  a área do triângulo  $[PAB]$

Resolva os dois itens seguintes, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos.

3.1. Mostre que  $S(x) = 2 \operatorname{sen} x + \operatorname{sen}(2x)$   $\left(x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\right]$

3.2. Mostre que existe um valor de  $x$  para o qual a área do triângulo  $[PAB]$  é máxima.

4. De uma certa função  $f$  sabe-se que:

- o seu domínio é  $]2, +\infty[$
- a sua **derivada** é dada por  $f'(x) = x^2 - 6x + \frac{19}{2} - 4 \ln(x - 2)$

4.1. Na Figura 3, estão representadas:

- parte do gráfico da função  $f$
- a reta  $r$  que é tangente ao gráfico da função  $f$  no ponto  $A$ , de abcissa 3
- a reta  $s$  que é tangente ao gráfico da função  $f$  no ponto  $B$




Figura 3

As retas  $r$  e  $s$  são paralelas.

Seja  $b$  a abcissa do ponto  $B$

Determine, recorrendo à calculadora gráfica, o valor de  $b$

Na sua resposta, deve:

- equacionar o problema;
- reproduzir e identificar o(s) gráfico(s) que tiver necessidade de visualizar na calculadora para resolver graficamente a equação;
- assinalar o ponto relevante para a resolução do problema;
- apresentar o valor de  $b$  arredondado às centésimas.

4.2. Tal como a figura sugere, o gráfico da função  $f$  tem um ponto de inflexão.

Determine a abcissa desse ponto, recorrendo a métodos exclusivamente analíticos.

5. Seja  $f$  a função de domínio  $\mathbb{R}$  definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xe^x - 3e^3}{x - 3} & \text{se } x < 3 \\ 4e^x + \ln(x - 2) & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Averigue se a função  $f$  é contínua em  $x = 3$

**FIM**

## COTAÇÕES

### GRUPO I

|         |                  |
|---------|------------------|
| 1. .... | 10 pontos        |
| 2. .... | 10 pontos        |
| 3. .... | 10 pontos        |
| 4. .... | 10 pontos        |
| 5. .... | 10 pontos        |
|         | <b>50 pontos</b> |

### GRUPO II

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 1. ....   | 20 pontos         |
| 2.        |                   |
| 2.1. .... | 15 pontos         |
| 2.2. .... | 15 pontos         |
| 3.        |                   |
| 3.1. .... | 20 pontos         |
| 3.2. .... | 20 pontos         |
| 4.        |                   |
| 4.1. .... | 20 pontos         |
| 4.2. .... | 20 pontos         |
| 5. ....   | 20 pontos         |
|           | <b>150 pontos</b> |

**TOTAL** ..... **200 pontos**